

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ВОЗМОЖНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ

(наркотики, транквилизаторы, снотворные, летучие растворители)

- **На** фоне полного здоровья покраснение глаз, зрачки неестественно сужены («булавочные зрачки») или расширены, коричневый налет на языке, рвота, отечность;
- **Ч**астое или внезапное нарушение координации движений;
- **Б**ледность кожи;
- **П**отеря аппетита, похудение или ожорство;
- **Х**ронический кашель или насморк;
- **С**остояние, похожее на опьянение (пошатывание и спотыкание), но без запаха алкоголя;
- **С**пецифический запах от одежды (запахи табачного дыма с примесями запахов трав или синтетики);
- **Ч**астые случаи забывчивости, бессвязной речи (незаконченные, рваные предложения, абсурдные заявления);
- **Л**юбое ухудшение поведения, изменение пищевых привычек. Резкая смена друзей, внезапная скрытность вместо прежнего доверия;
- **П**овышенная утомляемость, которая сменяется необъяснимой энергичностью;
- **Н**арушение памяти, неспособность логически мыслить, резкое снижение успеваемости;
- **С**вернутые в трубочку бумажки, маленькие ложечки, капсулы, бутылочки, пузырьки, незнакомые таблетки, порошки, следы от инъекций;
- **Н**еожданное долгое (вплоть до нескольких суток) отсутствие дома, пропажа денег, ценностей.