



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора


Главная опасность полиомиелита – осложнения:

- парезы и параличи различной локализации,
- ателектазы легких,
- пневмония,
- миокардит,
- желудочно-кишечные расстройства

Больной может погибнуть от дыхательной недостаточности, вызванной параличом дыхательных мышц



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора




Полиомиелит

Что важно знать?



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора




Полиомиелит

это опасное для жизни
инфекционное заболевание,
вызываемое энтеровирусами



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора



Источник инфекции


больной полиомиелитом
человек или носитель вируса

Как происходит заражение

- **преимущественно фекально-орально**
с загрязнённой водой и продуктами
питания
- **реже воздушно-капельным путем**
при кашле, чихании, разговоре



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора




**Заболеть может любой человек, не
привитый против полиомиелита!**

**Но наиболее подвержены
заболеванию дети:**

- не привитые против полиомиелита
- получившие менее 3-х прививок
- привитые с нарушением сроков вакцинации



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора



Симптомы

- **при абортивной форме**

лихорадка, слабость, ринит,
головная боль, тошнота и рвота, диарея

- **при менингеальной форме**


лихорадка, сильная головная боль, рвота,
боли в спине, шее, конечностях

- **при паралитической форме**

лихорадка, слабость, ринит, головная боль,
рвота, диарея, парезы и параличи мышц
тела и конечностей, контрактуры и
деформации суставов



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора



Параличи при полиомиелите:

- имеют стойкий характер
- сопровождаются атрофией мышц
- приводят к остеопорозу, переломам, сколиозу, нестабильности суставов

Около 30% случаев полиомиелита заканчиваются стойкими остаточными параличами, приводящими к инвалидизации



ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения»
Роспотребнадзора



Надежная защита от полиомиелита – вакцинация!

V1 – 3 месяца

V2 – 4.5 месяца

V3 – 6 месяцев

RV1 – в 18 месяцев

RV2 – в 20 месяцев

RV3 – в 6 лет

Три вакцинации и первая ревакцинация
проводятся инактивированной вакциной, а
последующие ревакцинации – живой