

КОРЬ – СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА

Информация для населения

Корь – высоко контагиозная, глобальная антропозная инфекция

Механизм передачи возбудителя воздушно-капельный.

Заражение происходит при контакте с больным, который выделяет вирус при кашле, чихании.



Первые проявления болезни начинаются на 10-21-й день после заражения.

Проявляется болезнь сыпью на теле ребенка.

Сыпь имеет вид розовых, немного возвышающихся на поверхности. Кожные пятна величиной с чечевицу; местами она бывает сливной; участки же кожи между элементами сыпи имеют окраску, что и придает коже коревого больного пестрый вид.

Лицо все сплошь покрыто сыпью. Этим корь существенно отличается от скарлатины, при которой остаются свободные от сыпи участки – нос и подбородок.



Характерными симптомами кори является лихорадка, температура поднимается до 38-39; этапное появление типичной сыпи на коже и слизистых оболочках; воспалительные явления со стороны слизистых оболочек дыхательных путей и глаз.

При первых симптомах срочно обращайтесь к врачу!

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ

Существует

Пассивная профилактика кори

Имуноглобулин человека нормальный

используется для пассивной профилактики кори, не позднее 72 часов от момента контакта.

Он представляет собой иммунологически активную белковую фракцию, выделенную из сыворотки или плазмы доноров.

Активная профилактика кори

Вакцинацию против кори проводят не болевшим корью детям в возрасте 12-15 месяцев. Вторая прививка вводится в возрасте 6 лет (перед школой). Использование второй дозы вакцины позволяет защитить детей, которые не были вакцинированы и кто не выработал иммунитет после первой дозы.



Эффективность прививки

При правильной вакцинации детей иммунитет вырабатывается у 95% вакцинированных. Иммунитет держится более 25 лет, лишь у очень небольшого числа вакцинированных он может угасать.

