

ПОЛИОМИЕЛИТ



Полиомиелит – опасное для жизни инфекционное заболевание, вызываемое энтеровирусами

Симптомы зависят от формы полиомиелита:



Абортивная

лихорадка, слабость, ринит, головная боль, тошнота и рвота, диарея



Менингеальная:

лихорадка, сильная головная боль, рвота, боли в спине, шее, конечностях



Паралитическая:

лихорадка, слабость, ринит, головная боль, рвота, диарея, парезы и параличи мышц тела и конечностей, контрактуры (ограничение подвижности) и деформации суставов



Источник инфекции

больной полиомиелитом человек или носитель вируса

Как передается

- преимущественно фекально-орально
- реже – воздушно-капельно

Полиомиелитом можно заболеть в любом возрасте, но наиболее подвержены заражению дети:

- не привитые против полиомиелита
- получившие менее 3-х прививок против полиомиелита
- привитые с нарушением сроков вакцинации

Лучшая защита от полиомиелита – вакцинация!

Вакцинация проводится по схеме:

V1 – 3 месяца → RV1 – в 18 месяцев
V2 – 4.5 месяца → RV2 – в 20 месяцев
V3 – 6 месяцев → RV3 – в 6 лет



Три вакцинации и первая ревакцинация проводятся инактивированной вакциной, а последующие ревакцинации – живой