

Эпидемический паротит



вирусная инфекция, характеризующаяся преимущественным поражением слюнных желез, реже — других железистых органов, а также центральной нервной системы

Пути передачи



Воздушно-капельный

вирус выделяется с капельками слюны



Контактно-бытовой

через полотенца, игрушки и другие инфицированные предметы

Источник инфекции

больной человек, который становится заразным за несколько дней до появления симптомов

Факторы риска

тесный длительный контакт с больным, скученность, отсутствие вакцинации



Симптомы:

- при поражении слюнных желез лихорадка, болезненная припухлость в области уха, сухость во рту, жажда
- при поражении поджелудочной железы лихорадка, опоясывающие боли в верхней части живота, тошнота и рвота
- при поражении половых желез лихорадка, у мужчин - боли в паху, увеличение пораженного яичка, у женщин - боли в нижней части живота
- при поражении нервной системы лихорадка, головная боль, ригидность мышц шеи, спутанность сознания, судороги, парезы

Вакцинация — лучшая защита от эпидемического паротита!

Плановая вакцинация детей проводится по схеме:
V — в 12 месяцев
RV — в 6 лет

Вакцинации против эпидемического паротита по эпидемическим показаниям подлежат контактные лица:

- ранее не болевшие
- непривитые
- привитые однократно
- не имеющие сведений о прививках